Диффдиагностика желтух

Инфекционные	Неинфекционные
Основные заболевания, сопровождающиеся надпеченочной желтухой (обусловлены усилением распада эритроцитов, повышением образования свободного билирубина, относительной недостаточностью функции захвата билирубина печенью)	
1. ЦМВИ (врожденная, приобретенная) 2. ГУС при острых кишечных инфекциях, ОРВИ 3. Малярия	1. Гемолитическая болезнь новорожденных 2. Гемолитическая анемия 3. Отравление гемолитическими ядами 4. Переливание несовместимой крови
Основные заболевания, сопровождающиеся печеночной желтухой (обусловлены поражением гепатоцитов)	
1. Гепатиты А, Е, В, С, D 2. Иерсиниоз, псевдотуберкулез 3. Лептоспироз 4. Инфекционный мононуклеоз 5. Инфекция простого герпеса (висцеральная форма) 6. Токсоплазмоз 7. ЦМВИ (врожденная, приобретенная) 8. Хронические гепатиты, стадия обострения 9. ВИЧ-инфекция 10. Сепсис 11. Брюшной тиф, сальмонеллез 12. Эхинококкоз 13. Врожденный сифилис	1. Пигментные гепатозы (Жильбера, Криглера—Найяра, Дабина—Джонсона, Ротора) 2. Токсические гепатиты 3. Медикаментозные гепатиты 4. Амилоидоз печени 5. «Реактивные» гепатиты при лейкозах, системных заболеваниях соединительной ткани
Основные заболевания, сопровождающиеся подпеченочной желтухой (возникают в результате нарушения проходимости желчных путей)	
1. Холестатический вариант гепатитов А, В, С, D, Е 2. Эхинококкоз печени с локализацией в воротах печени	1. Аномалии развития желчевыводящих путей 2. Спаечная болезнь 3. Холецистит, в том числе и калькулезный 4. Опухоль с локализацией в воротах печени, головке поджелудочной железы 5. Синдром «сгущения желчи» у новорожденных