

Серологические маркеры при вирусных гепатитах		
Возбудитель	Маркеры	Диагностическое значение
HAV	анти-HAV IgM IgG	Имеющаяся или недавно перенесенная инфекция Инфекция в настоящем или прошлом; указывает на иммунитет
HBV	HbsAg HBcAg HBeAg анти-HBc (IgM,IgG) анти-HBe анти-HBs	Положительный в большинстве случаев острого или хронического гепатита В сыворотке обычно не определяется Транзиторно-положительный при репликации вируса Положительные в случаях острой и хронической инфекции и у носителей - маркеры HBV-инфекции; не протективные; наличие анти-HBc IgM отражает репликацию вируса Транзиторно-позитивные при реконвалесценции, при некоторых формах хронической инфекции и у носителей, не протективные, отражают низкую инфекционность Позитивные в позднюю фазу реконвалесценции в большинстве острых случаев, протективные
HCV	анти-HCV	Становятся позитивными через 5-6 недель после появления клинических симптомов; не протективные; серопозитивные лица рассматриваются как инфицированные
HDV	Дельта Ag анти-HDV (IgM или IgG)	Маркер наличия HDV Указывают на инфицированность; не протективные
HEV	анти-HEV: IgM IgG	Имеющаяся или недавняя инфекция, реконвалесценция Инфекция в настоящем или прошлом; указывает на иммунитет