

АНТИМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

А) БЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ

1. ПЕНИЦИЛЛИНЫ

Природные

Международное наименование	Коммерческое наименование	путь	Дети	Взрослые
бензилпенициллин	- Penicillin G sodium порошок д/ин. во фл. по 1;5;10 млн МЕ - Benzympenicillini порошок д/ин. по 1;5 млн МЕ	в/м в/в	Старше 1 мес-50-200 тыс. ЕД/кг/сут в 4-6 введений. Эндолюмбально - 2000-5000 ЕД 1раз в 3дня → в/м	в/м 250-500 тыс. ЕД * 4-6 р/д. Тяжелые инфекции(менингит)- по 2-4 млн ЕД * 6 р/д в/в 2-5 млн ЕД/сут в 2 приема Эндолюмбально: 5-10 тыс.ЕД 1раз в 3 дня → в/м
феноксиметилпенициллин	Phenoxymethylpenicillinum Таб. 0,1; 0,25 Гран. д/сусп. во фл. по 100мл.(0,125/5мл)	Per os	Младше 1 года:20-30 мг/кг/сут. 1-6 лет: 15-30 мг/кг/сут 6-12 лет:10-20 мг/кг/сут старше12 лет: 500-1000мг/кг/сут в 4-6 приемов за 30 мин до еды	По 500-750 мг * 3-4 р/д за 30 мин до еды. Курс- 7-10 дней.
	Megacillin oral Таб.600 тыс;1млн МЕ Гран д/сусп. во фл. по 100мл(300тыс. МЕ/ 5мл)	Per os	Мл.10 лет: 50-100 тыс ЕД/кг/сут Ст. 10 лет: 3 млн ЕД/сут (ср. тяж) и 6-9 млн ЕД/сут(при тяж. течении). Кратность - 4-6 р/д.	Внутрь за 30 мин до еды по 3млн ЕД/сут (средняя тяжесть) и 6-9 млн ЕД (при тяжелом течении) в 4-6 приемов
	Ospen Таб. 0,25; 0,75	Per os	1-6 лет: 0,25 (400 тыс. МЕ) * 3р/д 6-12 лет:0,5 * 3 р/д	0,5-0,75 * 3-4р/д
	Сироп (750 000 МЕ/5 мл)	Per os	1-6 лет - по 2,5 мл(1/2 мерной ложки)* 3р/д 6-12 лет – по 5 мл (1 мерная ложка) * 3р/д Старше 12 лет - по 10 мл (2 мерные ложки) * 3р/д	-
	Таб. По 500 тыс, 1 и 1,5 млн МЕ	Per os	0,5 млн Ед * 3-4 р/д	1-1,5 млн МЕ * 3-4р/д

	Гран д/сусп. во фл. по 60 мл (400 тыс МЕ - 5мл)	Per os	3 мес-3 года: 1/2 мерной ложки * 3-4 р/д 3-6 лет: 1 мерная ложка * 3-4 р/д Старше 6 лет: 1-2 мерных ложки * 3-4 р/д	-
--	---	--------	---	---

Полусинтетические

- 1.1) Устойчивые к пенициллиназам с преимущественной активностью против грам(+) микроорганизмов("антистафилококковые").
Изоксазолпенициллины (метициллин, нафциллин, флоксациллин, **диклоксациллин**)

оксациллин	Oxacillin sodium Таб. 0,25 Oxacillin-natrium Таб. 0,25; 0,5 Капс. 0,5 порошок д/ин. во фл. по 0,25 и 0,5	Per os, в/м, в/в	Внутрь: новорожденные-90-150 мг/кг/сут до 3 мес-200 мг/кг/сут до 2 лет-1 г/сут 3-6 лет- 2 г/сут старше 6 лет- 3 г/сут в 4-6 приемов за 1 час до еды В/м, В/в новорожденные- 20-40 мг/кг/сут до 3 мес- 60-80мг/кг/сут до 2 лет – 1 г/сут 3-6 лет-2 г/сут старше 6 лет – 2-4 г/сут	Внутрь: 0,25-0,5 * 4-6 р/д за 1 час до еды В/м или в/в: 2-4 г/сут
------------	---	------------------------	---	--

- 1.2) Широкого спектра действия (за исключением пенициллиназообразующих стафилококков и синегнойной палочки).
Аминопенициллины

амоксициллин	Amoxicillin Таб. 0,5 Капс. 0,25; 0,5 Гран. д/сусп. во фл. по 100мл (0,25/5 мл) Порошок д/ин. во фл. по 0,5	Per os, в/м, в/в	Внутрь: До 2 лет – 20 мг/кг/сут 2 года 5 лет – 125мг * 3 р/д 5-10 лет – 250 мг * 3р/д Старше 10 лет – 500мг * 3 р/д в/м- 50 мг/кг/сут в 2 введения в/в- 100 мг/кг/сут в 2 введения	500- 750 мг * 2 р/д; при тяжелых инфекциях до 1 г * 3 р/д. МСД - 6 г.
--------------	---	------------------------	--	---

	Груналюкс Таб. 0,75;1,0 г Порошок д/сусп. (0,25/ 5 мл)	Per os	1-14 лет – 50 мг /кг/сут	1 таб * 3 р/д
	Ospamox Таб. 500 мг; 1 г Капс. 250 мг Гран. д/сусп (125 мг/5 мл; 250 мг/5 мл)	Per os	Младше 1 года: 1 мерная ложка * 2 р/д (гранулы 125 мг/5 мл) 1-6 лет: 1-1,5 мерных ложки * 2 р/д (гранулы 250 мг/ 5мл) 6-10 лет: 1,5-2 мер. ложки * 2 р/д 10-14 лет: 500 мг * 2р/д Старше 14 лет: 750 мг * 2р/д МСД-100 мг/кг	1000мг * 2 р/д, запить большим количеством воды. СД- 1500-2000 мг. МСД-6 г
	Flemoxin Solutab Таб. 125; 250; 500 мг и 1000 мг	Per os	СД (с 1 мес) – 30-60 мг/кг/сут в 2-3 приема 1-2 мес: 0,125-0,25 в 2 приема 3-8 мес: 187,5 мг/сут (1/2 таб. 0,125 * 2 р/д)- 375 мг/сут (0,125 * 3р/д) 8-12 мес: 250 мг/сут (0,125 * 2р/д)- 500 мг/сут (0,25 * 2р/сут) 1-3 лет: 375 мг/сут (0,125 * 3р/д) или 500 мг/сут (0,25 мг * 2 р/д) 3-10 лет : 750 мг (0,25 мг * 3 р/д) 10-12 лет: 750 мг(0,25 мг * 3 р/д) – 1500 мг (0,5 * 3 р/д). Курс – 5- 7 д.	500- 750 мг * 2 р/д или 375- 500 мг * 3 р/д независимо от приема пищи. При тяжелых инфекциях - 750мг – 1 г * 3р/д
Ампициллин	Ampicilline Таб, капс 0,25; 0,5 Порошок д/ин во фл. по 0,25;0,5; 1 и 2 г Гран. д/сусп. (0,125/5 мл и 0,25/5 мл) Сироп во фл. 100 мл (0,25/ 5мл)	Per os, в/м, в/в	Старше 1 мес- 100-200 мг/кг/сут в 4-6 приемов в/м, в/в: старше 1 мес-100 мг/кг/сут Тяжелые инфекции – 200-300 мг/кг/сут (до 400 мг/кг/сут).	Внутрь , независимо от приема пищи 0,5 * 4-6 р/д. В/м – по 0,25-0,5 г каждые 6-8 ч. Тяжелые инф. - в/м 1-2 г каждые 4-6 ч или в/в по 0,5 г каждые 6 ч.

■ 1.3) Широкого спектра действия с дополнительной активностью против синегнойной палочки (антипсевдомонадные")

Карбоксипенициллины

карбенициллин	Carbenicillinum-dinatricum Порошок д/ин. во дл.по 1000 мг.	в/м в/в	в/м 50-100 мг/кг/сут в 4-6 введений. в/в 250-500 мг/кг/сут.	В/м 50-80 мг/кг каждые 4-6 ч. В/в 20-30 г/сут.
---------------	--	------------	--	---

Уреидопенициллины.

азлоциллин	Azlocillin Порошок д/ин.во фл. по 1,2 и 5 г	в/м в/в	Недоношенные – 50 мг/кг * 2р/д Донош. до 7 дней – 100 мг/кг * 2р/д 7 дней- 1 год – 100мг/кг * 3р/д 1-14 лет – 75 мг/кг * 3р/д Старше 14 лет – 80-300 мг/кг/сут в 2-4 введения	2-4 г * 3-4 р/д. МСД- 24 г. Сут. доза- 80-150 мг/кг в 4 приема. При тяжелом течении – 200-300 мг/кг/сут в 2-3 приема.
пиперациллин	Piperacil Порошок д/ин. в амп. по 2 и 4 г.	в/в в/м	100-200 мг/кг/сут в 2-4 введения При тяжелом течении (септицемия- 200-300 мг/кг/сут). До 14 лет только в/в	100-200 мг/кг/сут в 2-4 введения (1-2 г через 6-8 ч или 4 г каждые 12 ч). В тяж. сл. – 200-300 мг/кг/сут (4г * 3-4 р/д). МСД - 24г.

1.4) Ингибитор-защищенные пенициллины (комбинированные пенициллины): пенициллин + сульбактам/ тазобактам/клавуланат.

Амоксициллин + клавулановая кислота	Amoksiklav , Amoclavin, Klavocin, Moxiclav Таб.375 №15 (250 + 125);625 (500+125) мг; 625 мг (500+125)	Per os	Старше 14 лет – по 375 * 3 р/д во время еды (при инфекции ДП- 40 мг/кг/сут в 3 приема)	375 мг 3 р/д (625 мг * 3 р/д при инфекции дыхательных путей)
	Порошок д/сусп:125+31,25 мг / 5 мл.	Per os	3 мес-1 года – по ½ мерной ложки * 3 р/д 1-7 лет – по 1 мерной ложке * 3 р/д 7-14 лет – по 2 мер. ложки * 3 р/д	-
	Порошок д/сусп. форте: 250 + 62,5/ 5 мл.	Per os	1-7 лет – по ½ мерной ложки * 3 р/д 7-14 лет – по 1 мерной ложке * 3 р/д	-
	Порошок д/капель орал. дет. во фл. по 20 мл (312,5 мг /5 мл)	Per os	Детям до 1 года – 0,75 – 1,25 мл.* 3 р/д	-
	Порошок д/ин. во фл. по 600 (500+100 мг) и 1200(1000+200) мг	в/в	Новорожденные-30 мг/кг через 12 ч 1-3 мес – 30 мг/кг через 8 ч 3 мес – 12 лет – 30 мг/кг через 6-8 ч.	Ст 12 лет - 1,2г через 8 ч (в тяжелых случаях – через 6 часов). МСД- 7,2 г.
	Augmentin Таб. 250/125, 625 (500/125), 875/125 мг порошок д/сусп во фл. 100мл	Per os	До 1 года- 2 мл * 3р/д 1-6 лет: 5 мл * 3р/д Ст 6 лет- 10 мл * 3 р/д	250мг * 3 р/д или 500мг * 2-3 р/д или 875мг * 2 р/д

	(125+31,25/ 5 мл)			
Ампиокс (ампициллин + клавулановая кислота)	Ampioxum капс. 0,25 порошок д/ин. во фл. по 0,1;0,2 0,5 г	Per os, в/м, в/в	До 1 года- 100-200 мг/кг/сут 1-7 лет – 100 мг/кг/сут 7-14лет- 50 мг/кг/сут Старше 14 лет: 2,0-4,0 г. в 4-6 приемов. Парентерально те же дозы	Внутрь: 2-4 г/сут в 4-6 приемов В/м, в/в- 2-4 г/сут. РД- 500мг. При тяжелой тяжести дозу можно увеличить в 2 раза
Ампициллин + сульбактам	Unasyn IM/IV Порошок 0,75 г (фл. по 10мл: 0,5+0,25); 1,5 г (фл. по 20мл: 1,0+0,5); 3,0 г (фл. по 20мл: 2,0+1,0)	в/м, в/в	150 мг/кг/сут (100мг/кг ампициллина + 50 мг/кг сульбактама) каждые 6-8 ч.	1,5- 12 г/сут каждые 6-8 ч. МСД- 12г(8 г+4 г), при нетяжелых инфекциях - каждые 12 ч.

2. ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

- 2.1. Первое поколение с преимущественной активностью против грам(+) микроорганизмов (цефрадин)

цефазолин	Cefazolinum порошок д/ин. во фл. по 1000мг. Kefzol, Nacef Порошок д/ин во фл 0,5 и 1 г в/в Порошок д/ин во фл 0,5 и 1 г в/м Порошок д/ин во фл 0,5 и 1 г в/в и в/м	в/м в/в	С 1 мес: 20-50 мг/кг/сут (в тяжелых случаях- до 100 мг/кг/сут) в 3-4 приема (каждые 6-8 ч)	Грам (+) – 0,25- 0,5 * 3 р/д Грам (-) – 0,5-1 г * 3-4 р/д МСД- 6 г.
цефалотин	Cefalotin порошок д/ин. во фл. по 0,5; 1;2 г.	в/м в/в	50-100 мг/кг/сут в 3-4 введения	0,5-2 г * 4-6 р/д
цефалексин	Cefalexin капс. 0,25; 0,5; порошок д/сусп. во фл. (125мг/ 5 мл; 250 мг/ 5 мл)	Per os	при массе менее 40 кг – 25-50 мг/кг/сут (до 100 мг/кг/сут) в 4 приема до еды	250-500 мг * 2-4 р/д до еды. МСД – 4 г.
цефадроксил	Duracef капс. 0,25; 0,5; пор. д/сусп. во фл. (125 и 250 мг/ 5 мл)	Per os	25-50 мг/кг/сут в 2 приема. Курс- 7- 14 дней. При массе тела более 40 кг- 1-2 г однократно или в 2 приема.	1-2 г в 1-2 приема

- 2.2. Второе поколение: широкого спектра действия (цефпрозил, цефрокситин, лораксафбеф)

цефаклор	Cefaclor, Alfacef, Ceclor	Per os	20 мг/кг/сут в 3 приема.	0,25мг * 3 р/д. МСД – 4 г.
----------	----------------------------------	--------	--------------------------	----------------------------

	капс. 0,25; 0,5 гран. д/сусп. во фл. 60 или 100мл (125 и 250 мг/ 5 мл) Ceclor MR Табл 0,375; 0,5; 0,75		МСД- 40 мг/кг/сут	
цефамандол	Цефамабол, Cefat, Mandol порошок д/ин. во фл. 500 мг; 1 г	в/м в/в	50-100 мг/кг/сут с интервалом в 4-8 ч. При тяжелых инфекциях- до 150 мг/кг/сут	500 мг – 2 г. каждые 4-8 ч. Заболевание МВС – 500 мг каждые 8 ч.
цефуроксим	Ketocef Порошок д/ин. во фл. по 750; 1500 мг. Цефурабол, Зинацеф Порошок д/ин во фл. по 0,25; 0,75; 1,5 г	в/м в/в	Младше 3 мес – 30 мг/кг/сут в 2-3 введения Старше 3 мес – 30-100 (чаще 60) мг/кг/сут в 3-4 введения	750 мг - Грам (+) каждые 6-8 ч. 1500мг – Грам (-) каждые 6-8ч.
Цефуроксима акцетил	Zinnat Таб. 0,125; 0,25 и 0,5 Гран д/сусп. во фл. (125 мг/ 5мл)	Per os	125 мг * 2 р/д; средний отит – 250 мг * 2 р/д.	0,25 мг * 3 р/д; ИМС – 125 мг * 3 р/д; тяжелые инфекции и пневмония – 500 мг * 2р/д.

- 2.3. Третье поколение: с преимущественной активностью против грам (-) микроорганизмов и некоторых анаэробов (цефподоксим, латамоксеф, цефиксим)

цефотаксим	Cefabol, Claforan порошок д/ин. во фл. 0,5; 1; 2 г.	в/м в/в	Новорожденные и дети младшего возраста: 50-100 мг/кг/сут в 2-4 введения. В тяжелых случаях – 150-200 мг/кг/сут Недоношенные: не более 50 мг/кг/сут Дети старше 12 лет: 1-2 г * 2 р/д	По 1 г (при тяжелых инфекциях по 2 г) через 8-12 ч. МСД – 12г.
цефтриаксон	Ceftriabolum, Rocefin, Медаксон Порошок д/ин.во фл. 0,25; 0,5; 1г. Tercef Порошок д/ин. во фл. 1 г. Lendacin порошок д/ин. во фл. по 0,25; 1 и 2 г.	в/м в/в	20-80 мг/кг/сут в 2 введения Недоношенные и новорожденные – 20-50 мг/кг/сут Старше 12 лет – 1-2 г * 1 р/д. МСД- 2г., новорожденные – 50 мг/кг/сут.	1-2 г * 1р/д. МСД – 4 г в 2 введения.
цефтибутен	Cedex Капс. 0,4	Per os	До 10 лет – 4,5-9 мг/кг/сут. МСД- 400 мг.	400 мг * 1 р/д Пневмония- 200 мг/сут

	Порошок д/сусп. во фл. (180 мг/5 мл)		Старше 10 лет – 0,2-0,4 * 1 р/д	
цефтазидим	Kefadim, Вицеф, Фортум Порошок д/ин 0,5 и 1 г	в/в в/м	-	1 г каждые 8-12 ч.
цефоперазон	Cefoperabolum, Cefobid, Сульперацеф (+ сульбактам) Порошок д/ин во фл. 1 г; 2 г	в/в в/м	50-200 мг/кг/сут в 2 введения (каждые 12 ч), новорожденным (< 8 дней)- через каждые 12 ч	2-4 г в 2 введения (каждые 12 ч)

2.4. Четвертое поколение (цефпиром)

Цефепим	Максицеф, Maxipime Порошок лиоф. д/ин. во фл. 0,5; 1 г.	в/м (глуб) в/в (медл)	При массе тела менее 40 кг – 50 мг/кг каждые 12 ч. МСД- 2-3 г. Старше 13 лет: 1 г * 2 р/д 7 дней	1 г каждые 1 ч. при тяжелых инфекциях – по 2 г каждые 12 часов.
---------	---	--------------------------------	--	--

2.5. Цефамицины (цефокситин, цефотетан)

цефокситин	Cefoxitin, Mefoxil порошок д/ин. во фл. по 1 и 2 г.	в/в в/м	20-40 мг/кг каждые 6-8 ч; новорожденным- через 8-12 ч.	РД - 1-2 г каждые 8 ч. При тяжелых инфекций- по 3 г каждые 6 ч.
цефметазол	Cefmetazole, Zefazone	в/в в/м		1-2 г * 1-2 р/д (каждые 12 ч) Курс- 4-10 дней

3. КАРБОПЕНЕМЫ

Тиенам (имипенем + циластатин)	Tienam Порошок д/ин. во фл. в/в по 0,5 имипенема и циластатина Порошок д/ин. во фл. в/м по 0,5; 0,75	в/м в/в	При массе тела < 40 кг- 15 мг/кг каждые 6 ч в/в. – МСД – 2 г. При массе тела > 40 кг – 1-2 г/сут (50 мг/кг/сут) в 3-4 введ. МСД- 4 г.	в/в – 1-2 г в 3-4 приема. МСД- 4 г. в/м – 0,5-0,75 каждые 12 ч
меропенем	Meropenem, Меропенабол Порошок д/ин. во фл. в/в по 0,5; 1,0 г Порошок д/ин. во фл. в/м по 0,5	в/в в/м	3 мес – 12 лет: 10-20 мг/кг каждые 8 ч; при менингите- 40 мг/кг * 3р/д При массе тела > 50 кг -0,5-1 г каждые 8 ч. Детям только в/в.	500 мг в/в каждые 8 ч, при внутрибол. инфекциях – 1 г * 3 р/д; менингит – 2 г * 3 р/д.

4.МОНОБАКТАМЫ

азтреонам	Aztreonam, Azactam Порошок д/ин. во фл. по 500 мг и 1 г.	в/в	Младше 2 лет: по 30 мг/кг каждые 6-8 ч	0,5 -2 г каждые 8-12 ч. МСД- 8 г.
-----------	--	-----	--	--------------------------------------

			2-12 лет: по 50 мг/кг каждые 6-8 ч. Старше 12 лет: 0,5 -2 г кажд. 8-12 ч.	
--	--	--	--	--

Б) АМИНОГЛИКОЗИДЫ.

Гентамицина сульфат	Gentamycinum Р-р д/ин. в амп. по 1 мл/ 10; 20; 40 мг. По 2 мл (1 мл/ 20, 40 мг)	в/м в/в	Младше 1 года – 2-5 мг\кг\сут 1-5 лет – 1,5-3 мг/кг/сут 6-14 лет – 3 мг/кг/сут С14 лет – 0,8-1,2 мг/кг/сут в 2-3введ МСД- 5 мг/кг/сут	3мг/кг/сут в 3 введения; при тяжелых инфекциях – 5 мг/кг/сут при ИМС – 0,8-1,2 мг/кг/сут
Амикацина сульфат	Amikacini sulfat, Амикин, Селемицин Порошок д/ин. во фл. по 250 и 500 мг.	в/м в/в	10 -15 мг/кг/сут в 2-3 введения в/м- 7-10 дней, в/в – 3-7 дней	По 500 мг * 2-3 р/д. Курс – 7-10 дней
Банеоцин (неомицин + бацитрацин)	Baneocin Порошок: полиэтил. контейнер по 10 г. Мазь: туба по 20 г.	наружно	Порошок – 2-4 р/д Мазь – 2-3 р/д (под повязкой) Курс – 7 дней	Тоже При повторном курсе – макс. доза уменьшается в 2 раза
Нетилмицина сульфат	Netromycin Р-р д/ин во фл. 2 мл (200 мг; 150 мг, 50 мг/ 1 мл)	в/м в/в	в/м: недоношенные и нов до 1 нед- 6 мг/кг/сут в 2 введения; с1 нед- 1 год: 7,5-9,0 мг/кг/сут в 3 введения; ст 1 года: 6,0-7,5 мг/кг/сут в 3 введения	в/м: 4,0-6,0 мг/кг/сут в 3 введения № 7-14 дней в/в: РД в 50-200 мл физ р-ра
Тобрамицина сульфат	Nebcin Р-р д/ин 20, 40, 80 мг/ 2 мл	в/м в/в	0,6-7,5 мг/кг/сут в 3-4 введения	3 мг/кг/сут в 3 введения (ИМС- 2-3 мг/кг/сут * 1р/д в/м

В) МАКРОЛИДЫ

а) Первое поколение

олеандомицин	Oleandomycin Таб. 0,125	Per os	Младше 3 лет: 0,02 г/кг/сут 3-6 лет: 0,25- 0,5 г/сут 6-14 лет: 0,5-1 г /сут Старше 14 лет: 1-1,5 г/сут Курс- 5-7 дней. СД- 30-50 мг/кг/сут в 4-6 приемов	0,25-0,5г. * 4-6 р/д после еды. МСД – 2 г.
--------------	-----------------------------------	--------	--	---

эритромицин	Erythromycin Таб. 0,2; 0,25; 0,5	Per os	Младше 14 лет – 30-50 мг/кг/сут Старше 14 лет – 250 мг* 4-6 р/д за 1-1,5 ч до еды.	250-500 мг * 4р/д (каждые 6 ч) за 1,5-2 часа до еды. МСД – 2 г. Курс 7-10 дней.
	Grunamycin Гран. д/сусп. во фл. по 60; 100 мл (0,2 г/ 5 мл)	Per os	См. выше	См. выше
	Порошок д/ин.во фл. по 0,05; 0,1; 0,2	в/в	20-50 мг/кг/сут в 2-3 введения	в/в 15-20 мг/кг/сут

б) Второе поколение

джозамицин	Vilprafen Таб. 0,5 Сусп. во фл. по 100 мл (150 мг / 5 мл) Сусп. форте во фл. по 100 мл (300 мг/5 мл)	Per os	30-50 мг/кг/сут 3 мес- 1 год: 7,5-15 мл/сут 1-6 лет: 15-30 мл/сут 6-14 лет: 30-45 мл/сут в 3 приема между приемами пищи	1-2 г/сут в 2-3 приема, между приемами пищи, не разжевывая, запить небольшим количеством воды.
кларитромицин	Klacid Таб. 0,25 Klacid SR Таб. 0,5 Гран. д/сусп. во фл. по 60; 100 мл (0,125 г/5 мл) Fromilid Таб. 250 и 500 мг (14 таб)	Per os	Младше 12 лет – по 7,5 мг/кг каждые 12 ч. МСД-500 мг. Курс – 7-10 дней. Принимать вне зависимости от приема пищи, глотать не разжевывая, запить небольшим кол-ом воды	По 250 мг каждые 12 часов № 7-14 дней. H. influenzae, синусит (14 дней), пневмония, тяжелые инфекции – по 500 мг каждые 12 ч. МСД- 2 г H. pylori – 250-500 мг * 2 р/д
мидекамицин	Macropen, Midecamycin Таб. 0,4 (16 таб.) Порошок д/сусп. во фл. по 115 мл (175 мг/ 5 мл) 1 ложка – 5 мл. ¾ ложечки – 3,75 мл ½ мл – 2,5 мл	Per os	30-50 мг/кг/сут до еды < 2 мес – 3,75 мл * 2 р/д 2 мес – 2 года: 7,5 мл * 2 р/д 2-4 года: по 10 мл * 2 р/д 4-6 лет: по 15 мл * 2 р/д 6-10 лет: по 400 мг * 3 р/д или 22,5 мл суспензии * 2 р/д СД- 30-50 мг/кг/сут в 2 приема. Курс – 7-10 дней.	400 мг * 3 р/д до еды. МСД -1,6 г. Курс – 7-14 дней.

рокситромицин	Roxithromycin Lek Таб. 0,15; 0,3 Rulid Таб.0,05; 0,1;0,15; 0,3	Per os	5-8 мг/кг/сут в 2 приема за 15-30 мин до еды, не более 10 дней. Старше 12 лет (при массе > 40 кг)- по 150 мг * 2 р/д	150 мг * 2 р/д или 300 мг 1 р/д до еды. Курс – 5-12 дней.
спирамицин	Rovamycin Таб. 1,5; 3 млн МЕ Гран. д/сусп. для детей в пакетиках (содержимое растворить в воде) 0,375; 0,75; 1,5 млн МЕ	Per os	Менее 10 кг: 2-4 пакетика гранул по 0,375 млн МЕ/сут 10-20 кг: 2-4 пакетика гранул по 0,75 млн МЕ/сут > 20 кг: 1,5 млн МЕ/(10кг*сут) за 2-3 приема	6-9 млн МЕ/сут в 2-3 приема
	Порошок д/ин. во фл. по 1,5 млн МЕ	в/в	в/в детям не назначается	При острых бронхолегочных заболеваниях – 1,5-3 млн МЕ каждые 8 ч.

в) Третье поколение

Азитромицин	Sumamed Таб. 0,125; 0,5 Капс. 0,25 Порошок д/сусп. орал. во фл. по 20 мл (0,1 г/5 мл) Sumamed forte Порошок д/сусп. во фл. по 20 мл (0,2г /5 мл); 30 мл (0,2 г/5мл)	Per os	10 мг/кг * 1 р/д в течение 3 дней В тяжелых случаях в 1 д- 20 мг/кг * 1р/д, затем со 2 по 5 день по 10 мг/кг * 1 р/д за 1 час до еды или через 2 ч после еды	1 день- 0,5, затем со 2 по 5 день по 0,25 * 1 р/д. При урогенитальной патологии – 1 г однократно. Болезнь Лайма – 1 г в 1 день, затем со 2 по 5 день по 500 мг
	Немомыцин Капс. 0,25	Per os	См. Сумамед	500 мг. * 1 р/д № 3 дня Уретрит, цервицит – 1 г однократно Helic. pylori 1 г * 1 р/д № 3 дня
	Azitral Капс. 250 мг №6	Per os	10 мг/кг 1 р/д № 3 дня	500 мг/сут за 1 прием. Курс- 3 дня.

Г) ЛИНКОЗАМИДЫ

клиндамицин	Dalacin C Капс. 0,15; 0,3 Гран д/сиропа во фл.(0,075г/ 5 мл) Klimicin Капс. 0,15	Per os	Младше 1 мес: 8-25 мг/кг/сут Старше 1 мес: 30-60 мг/кг/сут в 3-4 приема. Сироп: при массе тела до 10 кг – по 37,5 мг(1/2 ч.л. * 3 р/д)	150-450 мг * 4 р/д № 10-14 дней
	Dalacin C: Р-р д/ин. в амп. по 2 мл/0,3; 4 мл/0,6; 6 мл/ 0,9 г Klimicin Р-р д/ин.в амп. по 2 мл /0,3	в/м в/в	Младше 1 нед: 10 мг/кг/сут 2-4 нед: 20-30 мг/кг/сут Старше 1 мес: 30-40 мг/кг/сут в/в капельно в 3-4 введения	300 мг * 2 р/д, при тяжелых инфекциях- 1,2-2,7 г /сут в 3-4 введения. МСД- 4,8 г.
линкомицин	Lincomycini hydrochlorid Капс. 0,25 Р-р д/ин. в амп. 1 мл / 0,3	Per os в/м в/в	10-30 мг/кг/сут, при тяжелых инфекциях- до 60 мг/кг/сут № 10 дн. В/в – 10-20 мг/кг каждые 8-12 ч.	500 мг * 3-4 р/д за 1 час до еды или через 2 ч после. в/м – 600 мг * 1-2 р/д в/в – 600 мг * 2-3 р/д. МСД- 8 г.

Д) ТЕТРАЦИКЛИНЫ

тетрациклин	Tetracycline таб. 0,05; 0,1; 0,25	Per os	8-12 лет – 10-20 мг/кг/сут в 3-4 приема Старше 12 лет – 200-250 мг * 3-4 р/д	250-500 мг * 4 р/д во время или после еды. Курс- 5-7 дней.
	порошок д/ин. во фл. по 0,1 г.	в/м	8-10 лет – 0,05 * 2-3 р/д 10-14 лет – 0,06 * 2-3 р/д Старше 14 лет – 0,05-0,1 г * 2-3 р/д	0,1 г * 2-3 р/д
доксциклин	Doxycycline hydrochloridum Капс. 0,05; 0,1; 0,2 Таб. 0,1 и 0,2 г Порошок д/ин. в амп.по 0,1 и 0,2 г 2% р-р д/ин.во фл.0,1/ 5 мл. Юнидокс солютаб Таб. по 100 мг	Per os в/в	8-12 лет – 1-е сутки – 4 мг/кг/сут в 1-2 приема, затем по 2-3 мг/кг/сут * 1 р/д Старше 12 лет – см. взрослые	Во время еды с большим количеством жидкости. В 1-е сутки – 0,2 г в 1-2 приема, затем 0,1 г * 1 р/д. При тяжелом течении инфекции по 0,2 г (весь курс).
метациклин	Methacyclini hidrochloridum Капс. 0,15 ;0,3 г	Per os	5-12 лет: 7,5-10 мг/кг/сут в 2-4 приема Ст 12 лет: см взрослые № 7-10 дней	0,3 г * 2 р/д во время еды или сразу после еды

Е) ГЛИКОПЕПТИДЫ

тейкопланин				
ванкомицин	Vancomycinum, Edicin, Ванкоцин Х.О. Порошок д/ин. во фл. по 0,5 и 1,0 г.	Per os в/в	в/в: новорож. до 7 дней: капельно нач. доза – 15 мг/кг № менее 7 д, затем 10 мг/кг каждые 12 ч; до 1 мес НД – 15 мг/кг, затем 10 мг/кг каждые 8 ч. От 1 мес и старше: 40 мг/кг/сут в 2-4 приема. Внутрь: от 1 мес и старше – 40 мг/кг/сут в 3-4 приема, дозу разводят в 30 мл воды + сироп. МСД- 2 г. № 7-10 дней.	в/в: 500 мг каждые 6 ч или 1 г каждые 12 ч (не более 10 мг/кг в т. 60 мин) Внутрь: 500 мг – 2 г/сут за 3-4 приема № 7-10 дней (разведя в 30 мл воды)

Ж) ПОЛИМИКСИНЫ

Полимиксин В,М	Polymyxin B Порошок д/ин. во фл. по 0,025 (250 000 ЕД) и 0,05 (500 000 ЕД)	Per os в/м в/в	Менее 20 кг: 1,2- 2,4 мг/кг/сут 20-40 кг: 50 мг/сут 40-60 кг: 100 мг/сут в 2 введения Внутрь в виде вод р-ра – 4 мг/кг * 3 р/д. Курс – 5-7 дней	в/м – 0,5-0,7 мг/кг * 3-4 р/д. МСД – 200 мг. в/в – 2 мг/кг/сут в 2 приема. МСД- 150 мг. Внутрь- по 100 мг каждые 6 ч.
	Polymyxin M Таб. 500 000 ЕД Порошок во фл. по 500 000; 1 млн ЕД	Per os	3-4 года: 100 000 ЕД/кг/сут в 4-6 приемов 5-7 лет: 1,4 млн ЕД/сут 8-10 лет: 1,6 млн ЕД/сут 11-14 лет: 2 млн ЕД/сут	500 000 ЕД * 4-6 р/д СД – 2-3 млн ЕД Курс – 5-10 дней

З) ОКСАЗОЛИДИНОНЫ

линезолид	Зивокс - Р-р д/ин 2 мг/мл: одноразовые инфузионные пакеты по 100, 200 мл или 300 из пленки Excel - Таб. 400; 600 мг	Per os в/в	Старше 5 лет: 10 мг/кг per os каждые 12 ч (не более 600 мг каждые 12 ч) № 10-14 дней	600 мг каждые 12 ч № 10-14 дней
-----------	--	---------------	--	---------------------------------

	- Гран. д/сусп.			
--	-----------------	--	--	--

И) ИНГИБИТОРЫ ДНК – ГИРАЗЫ. ХИНОЛОНЫ.

1) Первое поколение

нитроксолин	Nitroxolinum Таб. 0,05	Per os	Младше 5 лет: 50 мг * 4 р/д Старше 5 лет: 50-100 мг * 4 р/д Моча окр в шафранно-желтый цвет.	100 мг * 4 р/д во время еды. МСД- 800 мг. Курс – 2-3 нед.
	5 – Nok Драже 0,05	Per os	Младше 5 лет: 50 мг * 4 р/д Старше 5 лет: 50-100 мг * 4 р/д	100 мг * 4 р/д во время еды. МСД- 800 мг. Курс – 2-3 нед.
	5- Nitrox Таб. 0,05	Per os	10-30 мг/кг/сут в 3-4 приема (через 6-8 ч) во время или после еды	600-800 мг/сут в 3-4 приема. МСД – 1-1,2 г. Курс -10-14 дней

2) Второе поколение

налидиксовая кислота	Nevigramon Капс.0,5	Per os	С 3 мес при ОКИ – 30 мг/кг/сут. Старше 2 лет: НД- 60 мг/кг/сут в 4 приема, ПД – 30 мг/кг/сут	0,5 г после еды, при более тяжелых инфекциях – по 0,1 г * 4 р/д № 7 дней.
	Negram Таб. 0,5	Per os	См. «Невиграмон»	См. «Невиграмон»
пипемидовая кислота	Palin Таб. 0,4 Капс. 0,2 Сусп. во фл. по 100 мл (0,1г /100 мл)	Per os	1-15 лет: 15 мг/кг/сут в 2 приема после еды	400 мг * 2 р/д № 10 дней.
	Urotractin Капс. 0,4	Per os	Не рекомендован детям до 14 лет	См. «Палин»

3) Третье поколение (фторхинолоны): грепафлоксацин, тровафлоксацин, моксифлоксацин.

левофлоксацин	Tavanic Таб. 250; 500 мг Р-р д/ин.во фл.по 100 мл (5 мг/1 мл)	Per os в/в	Противопоказан в детском и подростковом возрасте	250-500 мг * 1-2 р/д, запить стаканом воды. В/в капельно медленно (500мг за 60 мин)
лomeфлоксацин	Maxaguinum, Lomflox Таб. 0,4	Per os	Противопоказан в детском и подростковом возрасте	400 мг (до 600-800 мг) * 1 р/д. Курс – 5-14 дней.
норфлоксацин	Nolicin	Per os	Противопоказан в детском и	400 мг * 2 р/д за 1 час до еды

	Таб. 0,4		подростковом возрасте	или через 2 ч.после. МСД-1,6 г.
офлоксацин	Zanocin, Oflo Таб.0,2 Р-р д/ин. во фл. по 100 мл /0,2	Per os в/в	Противопоказан в детском и подростковом возрасте	200-400 мг * 2р/д. Курс- 7-10 дней. В/в при тяжелых инфекциях – 200 мг в 5% р-ре глюкозы
пefлоксацин	Abaktal, Pefloxacin Таб. 0,4 №10 Р-р д/ин.в амп. по 5 мл /0,4 г №10	Per os в/в	Противопоказан детям до 15 лет	400 мг * 2 р/д во время еды При ИМС – по 400 мг * 1 р/д. МСД -1200 мг. 1 амп (400 мг) + 250 мл 5% р-ра глюкозы в/в кап 2 р/д
спарфлоксацин	Sparflo Таб. 0,2	Per os	Противопоказан детям до 15 лет	1-й день – 0,4 г утром, затем 0,2 г * 1 р/д
ципрофлоксацин	Ciprofloxacin, Ципробай Таб. 0,25; 0,5 Ciprinol Таб. 0,25; 0,5 Р-р д/ин. во фл. по 100 мг/ 50 мл и 200 мг/ 100 мл Конц. д/ин. в амп. 100 мг/ 10 мл Ciprolet Таб. 0,25; 0,5 Р-р д/ин.во фл. по 200 мг/ 100 мл Cifran Таб. 0,5; 1 г.	Per os в/в	Противопоказан в детском и подростковом возрасте, за исключением случаев, когда преимущества лечения превышают риск вредного влияния	250 мг * 2-3 р/д, при тяжелых инфекциях 500-750 мг * 2-3 р/д. Курс – 7-14 дней. в/в – 200 мг (до 400 мг) * 2 р/д

К) СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ. СУЛЬФАНИАМИДЫ.

1) короткого действия

сульфадимидин	Sulfadimezinum Таб. 0,25 и 0,5 г.	Per os	До 3 лет – до 0,2 г/кг в 4 приема № 7 дней Старше 3 лет – по 0,4 – 0,75 г. 4 р/сут. Обильное щелочное питье.	1-й прием – 2-3 г, затем по 1 г каждые 6-8 ч. МСД – 7 г.
Сульфаэтидол (этазол)	Aethazolum Таб. 0,5	Per os в/в	До 2 лет: 100-300 мг каждые 4 ч 2-5 лет: 300-400 мг каждые 4 ч.	1-4 г * 4-6 р/д. МСД- 6 г. в/в через 8 ч.

	Р-р д/ин. в амп. по 10 мл (0,1; 0,2 г/ 1 мл)		5-12 лет: 500 мг каждые 4 ч, обильно запить боржоми в/в 0,1-0,5 г каждые 8 ч	
сульфаниламид	Streptocidum Таб. 0,3; 0,5 Unguentum streptocidi	Per os наружно	Младше 1 года: 0,15 г/кг/сут Старше года: 0,1 г /кг/сут в 4-6 приемов (запить стаканом воды с содой или боржоми)	500 мг – 1 г * 5-6 р/д. МСД – 7 г.
сульфатиазол	Norsulfazolum Таб. 0,5	Per os	Разовые дозы: 4 мес – 2 года: 100 мг-250 мг 2-5 лет: 300-400 мг 6-12 лет: 400-500 мг Прием через каждые 4-6-8 ч. 1-й прием – двойная доза	1-й прием – 2-3 г, затем по 1 г каждые 6-8 ч. МСД – 7 г.
Сульфагуанидин (ОКИ)	Sulginum Таб. 0,5	Per os	Младше 3 лет: 0,2 г/кг/сут в 3 приема Старше 3 лет: 0,4-0,75 г * 4 р/д после еды, обильное щелочное питье	1-й день: 1-2 г * 6 р/д; 2-й и 3-й дни: 1-2 г * 5 р/д; 4-й день * 4 р/д; 5-й день – 3 р/д. Курс- 5-7 дней. МСД – 7 г.
Фталилсульфатиазол (фталазол)	Phthalazolum Таб. 0,5	Per os	Младше 3 лет: 0,2 г/кг/сут в 3 приема Старше 3 лет: 0,4-0,75 г * 4 р/д после еды, обильное щелочное питье	1-й день: 1-2 г * 6 р/д; 2-й и 3-й день: 1-2 г * 5 р/д; 4-й день * 4 р/д; 5-й день * 3 р/д. Курс – 5-7 дней

2) среднего действия

сульфаметоксазол	Sulfamethoxazolum	Per os		
------------------	--------------------------	--------	--	--

3) длительного действия

сульфадиметоксин	Sulfadimethoxinum Таб. 0,2; 0,5	Per os	1-й день – 25 мг/кг/сут, затем 12,5 мг/кг/сут * 1 р/д после еды	1-й день – 1-2 г однократно, затем 0,5 – 1 г * 1 р/д
------------------	---	--------	---	--

4) сверхдлительного действия (сульфадоксин)

сульфален	Sulfalenum Таб. 0,2	Per os	1-й день – 25 мг/кг/сут, затем 10 мг/кг/сут * 1 р/д после еды	1-й день – 1 г за 30 мин до еды, затем 0,2/сут
-----------	-------------------------------	--------	---	--

5) сульфаниламиды с триметопримом

Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм)	Bactrim, Септрин Таб. 480 мг (400+80) Таб. Форте 960 мг (800+160) Сироп 240 мг/ 5 мл.	Per os	1,5-5 мес: ½ мерной ложки * 2 р/д 6 мес- 5 лет: 1 ложка * 2 р/д 5-12 лет: 2 ложки * 2 р/д	960 мг * 2 р/д, после еды, обильно запить водой. Курс -5- 14 дней
	Biseptol Таб. 120 мг(100+20); 480 мг (400+80) Суспензия (240 мг/ 5 мл)	Per os	Бисептол-120 (для детей): 2-5 лет: 2 таб * 2 р/д 5 -12 лет: 4 таб * 2 р/д Старше 12 лет: бисептол-480 (для взрослых): 1 таб. *2 р/д, после еды	Бисептол-480 (для взрослых): 2- 3 таб * 2 р/д, после еды, обильно запить водой. Курс – 5-14 дней.
Лидаприм (сульфаметрол + триметаприм)	Lidaprim Таб. 120 мг (100 + 20)	Per os	2-6 лет: по 2 таб * 2 р/д после еды с инт 12 ч., запивая водой № не менее 5 дней. 6-12 лет: по 4 таб * 2 р/д	

Л) НИТРОИМИДАЗОЛЫ

метронидазол	Metronidazol Таб. 0,25 Trichopol Таб. 0,25 Metrogil Таб.0,2; 0,4 Сусп. орал. (0,2/ 5 мл) Р-р д/ин.в амп. в/в по 20 мл (5 мг/1 мл); во фл. 100 мл (5 мг/ 1 мл)	Per os в/в	До 13 лет: 15-30 мг/кг/сут в 3 приема; новорожденные – в 1-2 приема Амебиаз: 35-50 мг/кг/сут в 3 приема № 8-10 дней Трихомониаз: 2-5 лет – 250 мг/сут; 5-10 лет- 250-375 мг/сут; 10 лет- 500 мг/сут в 3 приема Лямблиоз: 2-5 лет – 250 мг/сут; 5- 10 лет- 250-375 мг/сут; старше 10 лет – 500 мг/сут в 3 приема Анаэробная инфекция: 7,5 мк/кг * 3 р/д № 7-10 дней. В тяжелых сл. – в/в капельно – 7,5 мг/кг в 100 мл	Амебиаз: 0,6-0,8 * 3 р/д во время или после еды № 8-10 дней Трихомониаз: 400 мг * 2р/д № 5-8 дней Лямблиоз: 400 мг * 3 р/д № 5 дней или 250 мг * 2 р/д № 10 дней Helicob. pylori – 500 мг * 3 р/д № 7 дней Анаэробная инфекция: 400 мг * 3 р/д № 7-10 дней. В тяжелых случаях – в/в капельно – 500 мг в 100 мл растворителя через
--------------	--	---------------	--	---

			растворителя через каждые 8 ч. Вызывает потемнение мочи.	каждые 8 ч.
тинидазол	Tinidazol Таб. 0,15; 0,5	Per os	Трихомониаз и лямблиоз: 50-75 мг/кг/сут * 1 р/д № 1-2 дня Амебиаз: 50-60 мг/кг/сут № 3 дня Вызывает потемнение мочи	Трихомониаз и лямблиоз: 2 г однократно во время еды Амебиаз: 2 г * 1 р/д № 3 дня Анаэробная инфекция: 2 г в 1-й день, затем 0,5 мг* 2 р/д № 5-7 д

М) НИТРОФУРАНЫ

нитрофурантоин	Furadoninum Таб. 0,05; 0,1	Per os	5-8 мг/кг/сут в 3-4 приема во время еды, запивая большим кол-ом воды	0,1- 0,2 * 4 р/д. Курс не более 10 дней. МСД- 0,6 г.
фуразолидон	Furazolidonum Таб. 0,05	Per os	4-5 мг/кг/сут в 3-4 приема, через 10-15 мин после еды, обильно запить	2-3 таб. * 4 р/д № 5-7 дней
нифурател	Macmiror Драже 0,2	Per os	10-15 мг/кг * 1-3 р/д	1-2 таб. * 1-3 р/д. Курс- 7-14 д.
нифуроксазид	Ercefuril, Enterofuril Капс. 0,2 Суспензия (200 мг/ 5 мл)	Per os	1 мес – 2,5 года: 100 мг *т 2-3 р/д Старше 2,5 года: 200 мг * 3 р/д Курс не более 7 дней	200 мг * 4 р/д
фуразидин	Furaginum Таб. 0,05	Per os	5-8 мг/кг/сут в 3-4 приема во время еды, запивая большим кол-ом воды	0,1-0,2 г * 2-3 р/д Курс не более 10 дней

Н) АМФЕНИКОЛЫ

хлорамфеникол	Laevomycetinum Таб. 0,25; 0,5 Таб. пролонгированного действия по 0,65 Капс. 0,25 Sol. Laevomycitini succinatis во фл. по 0,5 и 1 г.	Per os в/в	Младше 2 нед- 25 мг/кг * 1 р/д 2-4 нед – 50 мг/кг в 2 приема Ст. 2 мес – 75-100 мг/кг в 4 приема Старше 3 лет – 15 мг/кг * 3-4 р/д 3-8 лет – 150-200 мг * 3-4 р/д Старше 8 лет – 200-400 мг * 3-4 р/д за 30 мин до еды, запивая стак. воды	По 250-500 мг * 3-4 р/д за 30 мин до еды № 7-10 дней. СД – 2 г.
---------------	---	---------------	--	---

О) АНТИБИОТИКИ РАЗНЫХ ГРУПП

фузидиевая кислота	Acidum fusidicum Таб. 0,25 г 5% р-р д/сусп. вофл. 90 мл Гран д/сусп 70 г Порошок д/ин. во фл. 0,5 г	Per os в/в в/м крем, мазь капли	До 1 года – 60-80 мг/кг/сут в 3 приема Старше 1 года – 20-40 мг/кг/сут в 3 приема. Курс – 7-10 дней	20-40 мг/кг/сут в 3 приема. Курс – 7-10 дней.
Фосфомицин тромамин	Урофосфабол, Fosfomycin tromethamine, Monural Порошок д/сусп по 3 г (в пакетиках)	Per os	-	Острый цистит- 3 г однократно, рецидивирующий цистит- 3 г каждые 10 дней № 3 мес.

П) ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОКСАЛИНА

диоксидин	Dioxydinum 1% р-р в амп 5 и 10 мл; 0,5% в амп 5, 10 и 20 мл	в/пол; в/в; мест	-	0,1- 0,5 г (10-50 мл 1 % р-р) . МСД- 0,7 г (70 мл 1% р-р) 1 -2 р/д в/полостное. № 3 нед
хиноксидин	Chinoxidinum Таб. 0,25 г	Per os	-	0,25 г * 4 р/д. Курс – 7-14 дней

Р) ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ (итраконазол, кетоконазол, клотримазол, миконазол, флуцитозин)

нистатин	Nistatin Таб. 250 и 500 тыс ЕД Супп. рект., супп. ваг. 250 и 500 тыс.ЕД	Per os	До 1 года: 100-125 тыс ЕД * 3-4 р/д 1-3 года: 250 тыс ЕД * 3-4 р/д Старше 3 лет: 250-500 тыс ЕД * 3-4 р/д за 1 час до еды	500 тыс ЕД * 3-4 р/д. СД – 1,5-3 млн ЕД. МСД – 4-6 млн. ЕД. Курс – 10-14 дней.
леворин	Levorinum Таб. 500 тыс ЕД Порошок д/сусп. 100 тыс ЕД/ 5 мл.	Per os	Младше 6 лет: 20-25 тыс ЕД/кг/сут 3-10 лет: 125 тыс ЕД * 3-4 р/д 10-15 лет: 250 тыс ЕД * 3-4 р/д	500 тыс ЕД * 3-4 р/д. Курс- 10- 14 дней.
натамицин	Pimafucinum Таб. 0,1	Per os	0,1г * 2 р/д	0,1 г * 4 р/д
Амфотерицин В	Amphotericini B Порошок д/ин во фл. по 50 тыс ЕД	в/в	Первые 5 вливаний: 1-3 года: 75-100 тыс ЕД 4-7 лет: 100-200 тыс ЕД 8-12 лет: 125-250 тыс ЕД	Для определения переносимости НД- 100 ЕД/кг. СД -250 ЕД/кг. При непереносимости ↑ до 1000 ЕД/кг. Назначается через

			13-18 лет: 150-300 тыс Е → увел.дозы → к 16-20-му вливанию: 1-3 года: 175-400 тыс ЕД 4-7 лет: 200-500 тыс ЕД 8-12 лет: 225-600 тыс ЕД 13-18 лет: 250-700 тыс ЕД → в/в капельно 3-6 ч. через день или 2 р/нед под контролем АД, ЧД, ЧСС.	день или 2 раза в неделю. Доза на курс – 1,5 – 2 млн ЕД.
Флюконазол	Diflazon Капс. 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 Р-р д/ин. во фл. по 200 мл (0,002/ 1 мл) Diflucan Капс. 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 Р-р д/ин. во фл. по 25,50 100,200 мл (0,002 / 1 мл) Порошок д/сусп. во фл. по 50 мл (0,05; 0,2 /5 мл) Mycosyst Капс. 0,05; 0,1;0,15 Р-р д/ин. во фл. по 100 мл (0,2г/5 мл)	Per os в/в	Кандидоз слизистых об.: 1-й день – 7 мг/кг/сут, затем 3 мг/кг/сут * 1 р/д. Курс – 7-14 дней Генерализованный кандидоз и криптококкоз – 6 -12 мг/кг/сут * 1 р/д У новорожденных флюконазол выводится медленно (дозы см. у старших детей, но в первые 2 нед- 1 раз в 3 дня; 3-4 нед – 1 раз в 2 дня)	Системный кандидоз: 1-й день 400 мг, затем 200-400 мг/сут * 1 р/д, в тяж случ. до 800 мг/сут (продолжают не менее 2 нед после исчезновения симптомов и получения отр. посева). Криптококковый менингит – не менее 6-8 недель Кандидоз кожи и слиз. об – 50- 100 (до 200) мг/сут Орофарингеальный кандидоз – 7-14 д
клотримазол	Candid Пластиковый флакон 15 мл	полос ть рта	10-20 капель с помощью ватной палочки - на пораженные участки ротовой полости 3-4 р/д № 5 дней	См. дети
нитрофунгин	Nitrofungin Флаконы по 25 мл	нару жно	Пораженные места 2-3 р/д	Пораженные места 2-3 р/д

С) ГРУППА РИФАМИЦИНОВ

рифампицин	Rifampicinum Капс. 0,15; 0,3	Per os в/в	Младше 8 лет: 15 мг/кг/сут Старше 8 лет: 10 мг/кг/сут, но не более 450 мг/сут в 2-3 приема за 1 ч до еды, обильно запить водой.	Менее 50 кг: 400 мг/сут Более 50 кг: 600 мг/сут в 2-3 приема за 1 ч до еды. Окр. мочу в красный цвет.
Рифаксимин (ОКИ)	Alfa normix Таб. 200 мг	Per os	Старше 12 лет – ½ дозы взрослого	ОКИ: 2 таб 2 р/д № 3-5 д

